

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE TRANSFUNDIDO SOBRE RIESGO O ALARMA DE REACCIÓN TRANSFUSIONAL TARDÍA



Reacciones Adversas a la Transfusión (RAT)

RAT es una respuesta indeseada e imprevista asociada a la transfusión de sangre o sus componentes o derivados.

Reacción Hemolítica Transfusional Tardía (RHTT)

Una RHTT usualmente se manifiesta entre las 24 horas y los 28 días después de una transfusión y las características clínicas están relacionadas con la destrucción de los glóbulos rojos. Por lo general, esta reacción es leve y solo se detecta cuando se hacen análisis de sangre.

Signos y Síntomas:

- ✓ **Fiebre:** Es un aumento de la temperatura del cuerpo, generalmente $> 38^{\circ}\text{C}$.
- ✓ **Escalofríos/temblor:** Son temblores que ocurren por una contracción y relajación muscular involuntaria, están generalmente asociados a la fiebre, provocando episodios de temblores con palidez y sensación de frío.
- ✓ **Eritema facial:** Es el enrojecimiento de la piel de la cara.
- ✓ **Cutáneos / Palidez e Ictericia:** La palidez es una pérdida anormal del color de la piel normal o de las membranas mucosas. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas.
- ✓ **Náuseas / vómito:** La náusea es una sensación de malestar o de estómago revuelto junto a una urgencia de vomitar.
- ✓ **Raras veces pueden presentarse otros síntomas menos comunes como:**
Dolor torácico, Dolor abdominal y Dificultad para respirar, que si son intensos se debe consultar al servicio de urgencias ya que pueden corresponder a otros cuadros clínicos importantes para ser valorados con prioridad.



En todos los casos agradecemos comunicarse al Banco de Sangre de la Clínica Rey David teléfonos: 5185000 ext 2307 ó 2322, donde llevamos la trazabilidad de nuestros productos.