




PREPARACIÓN ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA


Necesidad de acompañante: Todo usuario mayor a 65 años, o que su condición clínica o física requieran acompañante. Menores de edad. Estudios bajo sedación y biopsias (mama, tiroides, próstatas, histerosonografías)

ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA:

CONTRASTADOS

1

Ayuno, creatinina normal y reciente reporte no mayor a 15 días, Historia Clínica y venir con acompañante.




2

Formulario encuesta totalmente diligenciado y si es alérgico a comidas, medicamentos, o tiene antecedentes de asma debe realizar premedicación.
Prednisona de 50 mg 2 tabletas.



3

Resultado de creatinina elevado, deberá ingresar un día antes por el servicio de urgencias para realizar nefro protección.



PREPARACIÓN ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA

Necesidad de acompañante: Todo usuario mayor a 65 años, o que su condición clínica o física requieran acompañante. Menores de edad. Estudios bajo sedación y biopsias (mama, tiroides, próstatas, histerosonografías)

ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA:

TAC DE ABDOMEN Y PELVIS CONTRASTADO

1

6 horas antes de la toma del estudio

- Diluir la mitad medio de contraste oral (GASTROGRAFINA * 25 ml), en un litro de agua y tomar lentamente hasta terminarlo



2

2 horas antes de la toma del estudio


- Diluir el medio de contraste (GASTROGRAFINA * 25 ml, en un litro de agua y tomar lentamente hasta terminarlo)
- Ayuno Total



3

Traer resultado de creatinina

- No mayor a 15 días de realizado



4

Traer estudios anteriores

NOTA: Si toma **Metformina** debe suspenderse 48 horas antes del examen.

UROTAC: Venir con vejiga llena.